



TÜRK TORAKS DERNEĞİ


Toraks Kartları-9 AŞILAMA





TÜRK TORAKS DERNEĞİ

Pnömonokokal Aşılama



*: Hasta yüksek riskli ise ≥8 hafta sonra uygulanabilir.

** : PPSA23: 65 yaşından önce uygulanmış ise, en az 5 yıl sonra tekrarlanabilir.

Genel öneri, KPA 20 uygulanmıyorsa, PPSA3 ile tamamlanan aşılama programlarında 65 yaş üzerinde en az bir doz PPSA23 uygulanması yönündedir. İlk PPSA23 dozu ile arasında en az beş yıl süre olmalıdır.

PPSA: Pnömonokokal Polisakkarit Aşı, **KPA:** Konjuge Pnömonokok Aşısı



TÜRK TORAKS DERNEĞİ

Kronik Akciğer Hastalıklarında Aşılama

ETKEN	KİME	HANGİ AŞI	NE ZAMAN
İNFLUENZA	Tüm yaş grupları	Yıllık güncellenen aşılar	Erken sonbahar dönemi, Eylül - Ekim - Kasım
RSV	≥18 yaş kronik akciğer hastalıkları (RSVPreF3 ≥50 yaş), ≥75 yaş tüm bireyler	RSVPreF3 & <u>VEYA</u> RSVPreF [#]	Yaz sonu - sonbahar başı, Ağustos - Eylül - Ekim
COVID-19 ^φ	≥ 65 yaş tüm bireyler, kronik akciğer hastalıkları	2 veya 3 doz Güncel önerilere göre Primer seri + rapel dozlar	Yaz sonu - sonbahar başı, Ağustos - Eylül - Ekim
Td/TdaB	Kronik akciğer hastalıkları	TdaB/Td Rapellerden biri Tdap	Primer aşılama tamamlanmış ise 10 yılda bir rapel
ZONA REKOMBİMAN ZOSTER [⊠] (RZV)	≥ 50 yaş Zona öyküsüne bakılmaksızın	2 doz Zona ve komplikasyonlarını önlemek için	2-6 ay ara ile
SU ÇİÇEĞİ (VARİSELLA ZOSTER)	≥ 60 yaş Daha önce geçirmemiş veya bağışıklanmamış ise	1 doz Canlı aşı &	

&: Gebelikte önerilmez.

#: Gebeliğin 32-36.haftaları arasında tek doz olarak (Eylül - Ocak arasında) RSVPreF yapılması önerilir.

18 yaş ve üzeri kronik hastalık varlığında RSVPreF önerilir.

⊠: Gebelik ve immün yetmezlikte önerilmez.

φ: Önerilen güncellenmiş aşılar ülkemizde bulunmamaktadır.